

Dipendenza da Sesso e Disfunzioni Sessuali

Ricerca, in Italia, su campione di 1046 soggetti.

Direttore della ricerca:

Franco Avenia

Coordinatore generale:

Annalisa Pistuddi

Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia (AIRS)

.....

.....

La Dipendenza da Sesso (Sexual Addiction), si caratterizza come “l'impossibilità di resistere agli impulsi sessuali”.

**Secondo il National Council of Sexual Addiction:
“Persistente e crescente modalità di comportamento sessuale messo in atto nonostante il manifestarsi di conseguenze negative per sé e per gli altri”
(NCSA- USA 1987).**

La Dipendenza da Sesso ha conseguenze gravi sia a livello individuale che sociale.

Il 55% dei dipendenti da sesso commette con alta frequenza reati a sfondo sessuale (Herkov et al., 2001) .

In considerazione, dunque, della rilevanza non solo psico-sessuologica, ma altresì della pericolosità sociale del fenomeno, abbiamo realizzato, in Italia, negli anni 2003 e 2004, una ricerca per valutare la presenza di Dipendenza da Sesso.

Scopo della Ricerca: stimare la presenza della dipendenza da Sesso in Italia e quali i soggetti più a rischio, correlandoli anche con le **Disfunzioni Sessuali.**

Materiali e Metodi


Il questionario utilizzato è il
"Sexual Addiction Inventory" (SAI/2),
di Franco Avenia,
composto da 37 domande a risposta dicotomica si/no, inserito attualmente
nell'assessment psicodiagnostico nella pratica clinica delle dipendenze dagli
operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze.

I questionari somministrati in 11 province: 1556; ritenuti validi: 1046.
Il metodo di rilevazione: inchiesta su campione casuale a risposta scritta.
Il campione preso in esame: 1046 soggetti in età di voto:

53,5% donne (564), 46,5% uomini (482).

Risultati


**I dati emersi mostrano
una dipendenza media del 6,3%, così distribuita:
10% (56) tra gli uomini
2% (10) tra le donne.**




I dati si mostrano congrui con le precedenti rilevazioni:

- **USA 1991: presenza di DdS dal 3 al 6%**
Carnes, campione di 932 soggetti
- **Italia 2003: presenza di DdS del 5% nella popolazione maschile e del 3% nella popolazione femminile**
Cedis, campione di 240 soggetti
- **Italia 2002-2003: presenza di DdS del 5,75% nella popolazione m/f**
AIRS, SAI/1, campione di 191 soggetti

Disfunzioni Sessuali: Uomini dipendenti da sesso



Disfunzioni Sessuali: Donne dipendenti da sesso



Conclusioni

- Per quanto riguarda gli uomini dipendenti da sesso, in considerazione del fatto che le disfunzioni sessuali si presentano in misura decisamente minore della media di quanto solitamente rilevato nella popolazione maschile, si conclude che non vi è correlazione significativa tra dipendenza da sesso e disfunzioni sessuali.
- Stessa conclusione può essere tratta per quel che attiene alle donne dipendenti da sesso, seppur considerando che la difficoltà nel raggiungimento dell'orgasmo è più alta delle medie comunemente rilevate.
- Pertanto le cause della dipendenza da sesso, fenomeno di sicura rilevanza sociale oltre che sessuologica, vanno rintracciate in altre direzioni.